

¿Qué es Vimovo®?

1 comprimido de liberación modificada que contiene
500 mg de naproxeno y 20 mg de esomeprazol.¹

Indicado en adultos para el tratamiento sintomático de^{*1}:



Artrosis¹



**Artritis
reumatoide¹**



**Espondilitis
anquilosante¹**



Adherencia
subóptima en
37%
de pacientes
con AINEs^{†2}

Y **VIMOVO®** garantiza la toma
del gastroprotector y el AINE al
mismo tiempo¹


* En pacientes con riesgo de desarrollar úlceras gástricas y/o duodenales asociadas a medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en los que no se considera suficiente el tratamiento con dosis menores de naproxeno o de otros AINE.

† En la práctica clínica, la adherencia al gastroprotector en pacientes que reciben tratamientos con AINEs es subóptima en al menos el 37% de los pacientes (intervalo de confianza del 95%, 33,3-40,0%). P< 0,001

AINE: antiinflamatorio no esteroideo.

Liberación secuencial

Mecanismo de liberación secuencial en 1 comprimido^{1,3}



IBP: inhibidor de la bomba de protones.

Seguridad



Cardiovascular

Naproxeno, componente de Vimovo®, es uno de los AINE más seguros en cuanto al riesgo CV.⁴



Gastrointestinal

Esomeprazol, componente de Vimovo®, ha demostrado eficacia en la prevención de ulceras en aquellos pacientes que tienen riesgo a desarrollarlas por la toma de AINE a largo plazo, incluyendo los COXIBS.⁵

Algoritmo de recomendaciones

Vimovo® reduce el riesgo de úlcera péptica en pacientes con riesgo gastrointestinal asociado al tratamiento con AINE.⁶

Posología

1 comprimido
(500 mg / 20 mg)
dos veces al día¹



RECOMENDACIONES

- Vimovo® debe tomarse entero con agua, sin partirlo, masticarlo ni triturarlo.¹
- Tomar Vimovo® al menos 30 minutos antes de la ingesta de alimentos.¹



- **60 comprimidos de liberación modificada. Tratamiento para 1 mes.¹**

Vimovo® | Bibliografía

1. Ficha Técnica de Vimovo®.
2. Sturkenboom MC, Burke TA, Tangelder MJ, Dieleman JP, Walton S, Goldstein JL. Adherence to proton pump inhibitors or H₂-receptor antagonists during the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. *Aliment Pharmacol Ther.* 2003 Dec;18(11-12):1137-47.
3. Wang-Smith L, Fort J, Zhang Y. Pharmacokinetics and relative bioavailability of a fixed-dose combination of enteric-coated naproxen and non-enteric-coated esomeprazole magnesium. *J Clin Pharmacol.* 2012 May;52(5):670-80
4. Lanas A, Benito P, Alonso J et al. Recomendaciones para una prescripción segura de antiinflamatorios no esteroideos: documento de consenso elaborado por expertos nominados por 3 sociedades científicas (SER-SEC-AEG). *Gastroenterol Hepatol.* 2014 Mar;37(3):107-27
5. Scheiman JM, Yeomans ND, Talley NJ et al. Prevention of ulcers by esomeprazole in at-risk patients using non-selective NSAIDs and COX-2 inhibitors. *Am J Gastroenterol.* 2006 Apr;101(4):701-10.
6. Goldstein JL, Hochberg MC, Fort JG, Zhang Y, Hwang C, Sostek M. Clinical trial: the incidence of NSAID-associated endoscopic gastric ulcers in patients treated with PN 400 (naproxen plus esomeprazole magnesium) vs. enteric-coated naproxen alone. *Aliment Pharmacol Ther.* 2010 Aug;32(3):401-13.
7. Hochberg MC, Fort JG, Svensson O, Hwang C, Sostek M. Fixed-dose combination of enteric-coated naproxen and immediate release esomeprazole has comparable efficacy to celecoxib for knee osteoarthritis: Two randomized trials. *Curr Med Res Opin.* 2011 Jun;27(6):1243-53.
8. Datto C, Hellmund R, Siddiqui MK. Efficacy and tolerability of naproxen/esomeprazole magnesium tablets compared with non-specific NSAIDs and COX-2 inhibitors: a systematic review and network analyses. *Open Access Rheumatol.* 2013 Feb 26;5:1-19.
9. Cryer BL, Sostek MB, Fort JG, Svensson O, Hwang C, Hochberg MC. A fixed-dose combination of naproxen and esomeprazole magnesium has comparable upper gastrointestinal tolerability to celecoxib in patients with osteoarthritis of the knee: results from two randomized, parallel-group, placebo-controlled trials. *Ann Med.* 2011 Dec;43(8):594-605.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Parque Norte, Edificio Álamo.
C/ Serrano Galvache, 56. 28033 Madrid (Spain)

PROMOCIONADO POR



Calle Dr. Zamenhof, 36, 28027 Madrid
www.grunenthalhealth.es

Vimovo®
500 mg de Naproxeno
20 mg de Esomeprazol